

Dokumentnamn Utförande och förberedelser av kantotomi och kantolys			Identitet STÖ-31168	Säkerhetsklass K1R1T1	
Dokumenttyp Stödjande	Dokumentkategori Anvisning	Gäller för S:t Eriks Ögonsjukhus	Skapat	Senast uppdaterat 2019-04-08	Sida 1 (2)
Dokumentägare Elin Bohman		Granskare Elin Bohman	Dokumentförfattare Stina Edin		

## Utförande och förberedelser av kantotomi och kantolys

### Tillvägagångssätt

1. Placera ett underlägg under patientens huvud och det andra underlägget på exempelvis ett bord eller annan lämplig yta.
2. Fäst den rosa uppdragningskanylen på 3 ml sprutan och dra upp lokalbedövning. Sätt därefter fast den gråa injiceringskanylen på sprutan.
3. Placera samtliga instrument åtkomliga på underlägget.
4. **Droppa lokalbedövning** (Oxibuprokain 0,4 % eller Tetracain 1 %) i konjunktivalsäcken x3 med någon minuts mellanrum.
5. Tvätta hudområdet kring laterala kantus.
6. Lagg **infiltrationsanestesi** längs laterala kantalligamentet samt lateralt i övre och nedre ögonlocket.
7. Vänta och kontrollera bedövningen med pincett.
8. Tag **rak peang** och kläm åt rakt ut från laterala ögonvrån och mot orbitakanten. Låt sitta några sekunder. (Detta gör att det blöder mindre. Detta kan uteslutas vid tillgång till diatermi).
9. Tag **rak Stevens sax** och gör ett klipp rakt ut från laterala ögonvrån ned till orbitakanten.
10. Ta tag med **klopincetten** i nedre ögonlocket/tarsen och lyft uppåt så det sträcks. Nedre kantalligamentet kan då kännas som *en sträng* under tarsen.
11. **Sätt saxskänklarna** på var sin sida om **kantalligamentet och klipp**. Då kan man med pincetthanden känna att ögonlocket släpper.
12. Håll kvar draget med pincetten och känn igen med saxen. Ofta kan man behöva 2-3 klipp innan hela kantalligamentet är av.
13. Gör samma procedur med det övre kantalligamentet.
14. Det kommer att blöda från kärlbågen som går under tarsen. Tag kompress och **komprimera mot benet** (inte mot ögat).
15. När det slutat blöda applicera ögonsalva med antibiotika i ögat.
16. Fäst därefter med tejp en luftig kompress över såret vilket lämnas att glipa.

## Kantotomiset för bedsideanvändning

### Innehåll:

- Rak peang
- Rak Stevens sax
- Klopincett

### Detta behövs även:

- Absorberande underlägg, **två stycken** (ett placeras under huvudet och ett under instrumenten)
- Xylocain® adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml, läkemedel för lokalbedövning
- Oxibuprokain 0,4 % eller Tetracain 1 %, läkemedel för bedövning av konjunktiva
- 3 ml spruta
- Rosa uppdragskanyl (18G)
- Grå injiceringskanyl (23G)
- Sterila kompresser 10x10 cm
- Desinfektionsservetter eller kompresser med Klorhexidinsprit 5 mg/ml för att utföra huddesinfektion.
- Engångsplastförkläde
- Sterila handskar om möjligt annars engångshandskar (undersökningshandskar)
- Sårtejp
- Kloramfenikol 10 mg/ml eller likande ögonsalva innehållande antibiotika